

Rehevöityminen

Punkalaitumella rehevöityminen ilmenee lähinnä järvissä ja joissa. Esimerkiksi Vehkajärvellä on esiintynyt sinilevälauttoja parin vuosikymmenen ajan. Sen lisäksi rantakasvillisuus on lisääntynyt sekä laitureiden, kivien ja kalastusvälineiden pinnat limoittuvat.



Rehevöitymistä on pyritty vähentämään esimerkiksi nuottaamalla roskakaloja kuten särkiä.



Taulukko 1

<http://www.ymparisto.fi//default.asp?contentid=372888&lan=fi&clan=fi>

Järvi tai sen osa	N60+W m	Pinta-ala km ²		Rantaviiva km	
		Kokonaispinta-ala	Punkalaidun	Kokonaisrantaviiva	Punkalaidun
Ahvenuslammi	121,4	0,07	0,01	1,4	0,1
Aukanjärvi	111,1	0,07	0,07	1,4	1,4
Latvajärvi	109,6	0,2	0,003	3,1	0,2
Ruokojärvi	94,2	0,05	0,05	1,4	1,4
Sammakkajärvi	114	0,30	0,26	5,4	4,4
Vehkajärvi	95,1	1,91	1,79	12,1	10,9

Joissa rehevöitymistä on pyritty estämään suojakaistoilla, jotka estävät ravinteiden pääsyn pelloilta jokeen.

